

LA SANTÉ DE LA MÈRE ET DE L'ENFANT

2009 - 2012

Données issues des certificats de santé
8^{ème} jour, 9^{ème} et 24^{ème} mois

Ce document a été réalisé à partir des données épidémiologiques concernant les enfants domiciliés en Haute-Vienne, pour une période de 4 années (2009–2012). Les principaux indicateurs de périnatalité et de la petite enfance présentés sont issus de l'exploitation anonyme des données des certificats de santé du 8^{ème} jour, du 9^{ème} mois et du 24^{ème} mois, remplis par des pédiatres, des omnipraticiens libéraux ou des médecins de Protection maternelle et infantile.

Destiné aux professionnels de santé, il contribue à une meilleure connaissance de l'état de santé des mères et des enfants du département et vise à favoriser le travail partenarial entre tous les acteurs de la prévention et du soin pour une meilleure prise en charge globale, le plus précocement possible.




INDICATEURS DÉMOGRAPHIQUES

Le Limousin est une région à faible fécondité. La Haute-Vienne rassemble à elle seule 50 % de la population limousine et 54 % des naissances de la région. Son poids dans le total des naissances progresse régulièrement depuis le début des années 1990, signe de la concentration à Limoges des populations en âge de procréer (source INSEE Limousin).

En 2010, avec 10,2 naissances pour mille habitants, le taux de natalité en Haute-Vienne (9,4‰ en Limousin) reste cependant plus faible que le taux national (12,8‰ en France métropolitaine).

	Haute-Vienne	Limousin	France métropolitaine
Population totale (estimation 2010)	376 885	744 187	62 791 000
Taux de fécondité (2010) <i>Nb naissances vivantes pour 1000 femmes 15 à 49 ans</i>	47,3 ‰	46,6 ‰	55,8 ‰
Naissances vivantes domiciliées (2010)	3 848	7 014	801 000
Taux de natalité (2010) <i>Nb naissances vivantes domiciliées pour 1000 habitants</i>	10,2 ‰	9,4 ‰	12,8 ‰
Taux de mortalité infantile (2008-2010) <i>Nb décès d'enfants < 1 an pour 1000 naissances vivantes</i>	3,3 ‰	3,0 ‰	3,6 ‰
Taux de mortalité périnatale (2008-2010)	9,9 ‰	9,6 ‰	10,3 ‰

Source : Insee, Etat civil



Source : Insee

LE TAUX DE COUVERTURE

	2009	2010	2011	2012	Haute-Vienne 2009 - 2012	Limousin 2011
CS 8^{ème} jour	96,3%	96,0%	96,4%	94,9%	95,9%	95,1%
CS 9^{ème} mois	75,6%	75,1%	72,5%	69,8%	73,2%	64,3%
CS 24^{ème} mois	64,1%	62,3%	60,6%	56,7%	60,9%	55,5%

Sources : CG87, DREES


Les CS8 sont transmis directement par les 3 maternités du département. Pour les CS9 et 24, l'expédition est prévue par le médecin dans les 8 jours. On observe une baisse régulière de leur taux de réception sur les quatre années. La mise à disposition dans le carnet de santé, depuis l'automne 2013, d'une enveloppe T avec le formulaire de certificat devrait favoriser son retour.

LES MÈRES

L'âge des mères à la naissance des enfants - - - - -> TR = 99,5%*

En moyenne, chaque année, sur les 3700 femmes qui accouchent, 21 sont mineures (0,6%) dont 3 âgées de 14-15 ans et 18 de 16-17 ans. Les maternités plus tardives (à partir de 40 ans) ont tendance à être plus nombreuses depuis quelques années : elles concernent 151 mères en moyenne (4,1%).

Cependant, l'âge moyen à l'accouchement des femmes a cessé de reculer et reste globalement stable depuis 2009 : 29,9 ans (France métropolitaine en 2011 : 30,1 ans).



* TR : Taux de réponse pour chaque item

Suivi de la grossesse

Environ 1 femme enceinte sur 10 a été hospitalisée au cours de sa grossesse avec une durée moyenne de séjour de 4 jours. Les motifs d'hospitalisation les plus fréquents sont la menace d'accouchement prématurée (98 femmes), l'hypertension artérielle gravidique (50 femmes) et le retard de croissance intra-utérin (26 femmes).


	2009	2010	2011	2012	Haute-Vienne 2009 - 2012
Préparation à la naissance	46,4 %	41,9 %	40,0 %	43,8 %	50,5 %
Recherche Ag Hbs	97,8%	98,8%	98,7%	98,1%	98,3 %
Résultat positif Ag Hbs	0,7%	0,6%	0,8%	8,2%	2,5%
Hospitalisation pdt grossesse	9,5%	11,2%	11,7%	8,4%	10,2 %
Durée moyenne séjour (jours)	4,2	6,2	4,7	2,5	4,2

L'ACCOUCHEMENT

Parité -----> **TR = 97,9%***

En moyenne, chaque année, plus de 4 femmes sur 10 (45,1%) accouchent pour la première fois.


Nombre total d'accouchements



Analgésie -----> **TR = 98,1 %***

En moyenne, chaque année, près de 3 femmes sur 4 accouchent sous péridurale et plus de 300 femmes (9%) sans aucune analgésie.

Type d'analgésie




Travail -----> TR = 98,3 %*

Lors de l'accouchement, la présentation céphalique est la plus fréquente (95,3%). Dans près de 5% des cas, l'enfant se présente dans une position différente (par le siège essentiellement).


Mode de naissance -----> TR = 97,1 %*

Le taux de césarienne oscille chaque année autour de 20% (21% en France métropolitaine). L'indication d'une césarienne est d'origine maternelle dans 43% des cas et fœtale dans un tiers des cas.



LES ENFANTS A LA NAISSANCE

Lieu de naissance -----> TR = 100 %*



Sexe -----> TR = 100 %*

A la naissance, les garçons sont plus nombreux (50,6%) que les filles (49,4%).

Terme de la grossesse -----> TR = 97,8 %*


L'âge gestationnel moyen est de 39 semaines d'aménorrhée (SA).

Enfants prématurés- - - - -> TR = 97,8 %*

Le taux moyen de prématurité est de 6,6 % contre 7,4 % en France métropolitaine.

Age gestationnel	2009	2010	2011	2012	Hte-Vienne 2009 - 2012	France métropolitaine ENP 2010
< 28 SA	6	5	6	6	0,2 %	0,7 %
28 - 32 SA	38	34	27	23	0,8 %	1,2 %
33 - 36 SA	194	213	207	192	5,6 %	5,5 %
≥ 37 SA	3507	3340	3447	3296	93,4 %	92,6 %


Répartition des prématurés selon l'âge gestationnel



Poids de naissance- - - - -> CS = 99,5 %*

Le poids moyen de naissance s'élève à 3225 g.

En moyenne, le taux de faible poids à la naissance (< 2500 g) est de 7,5% contre 7,1% en France métropolitaine.




Enfants transférés- - - - -> TR = 84,0 %*

En moyenne, le taux de transfert néonatal est de 5,8 % contre 6,6% en France métropolitaine (Enquête nationale périnatale 2010).

ALLAITEMENT MATERNEL

En moyenne, le taux d'allaitement est de 62% à la sortie de la maternité (60,2% en France métropolitaine).

Au 9^{ème} mois, d'après les déclarations, un peu plus de la moitié des enfants (55 %) ont été ou sont encore allaités au sein, avec une durée moyenne d'allaitement de 17 semaines. On retrouve le même pourcentage au 24^{ème} mois, avec une durée moyenne d'allaitement de 20 semaines.




Santé de l'enfant

Développement staturo-pondéral 2009-2012	CS 8 ^{ème} jour		CS 9 ^{ème} mois		CS 24 ^{ème} mois	
	Garçon	Fille	Garçon	Fille	Garçon	Fille
Poids moyen	3273 g	3161 g	9010 g	8653 g	12443 g	12045 g
Taille moyenne	50 cm	49 cm	72 cm	71 cm	88 cm	87 cm
Insuffisance pondérale <i>IMC* < 3^{ème} percentile</i>			4,5 %	3,9 %	9,2 %	8,9 %
Surpoids ou obésité <i>IMC* > 97^{ème} percentile</i>			3,7 %	4,2 %	3,0 %	3,0 %
IMC* normal			91,8 %	91,9 %	87,8 %	88,1 %

*IMC : Indice de masse corporelle

Réalisation de l'examen médical - - - - -> TR = 100 %*



Hospitalisation des enfants - - - - -> CS = 100 %*

Enfants hospitalisés ≥ 1 fois	2009	2010	2011	2012	Haute-Vienne 2009 - 2012
Après le 1 ^{er} mois	5,5 %	3,5 %	3,4 %	3,1 %	3,9 %
Après le 9 ^{ème} mois	3,6 %	4,0 %	4,0 %	4,6 %	4,0 %

Vaccinations

Couverture vaccinale complète 2009 - 2012		CS 9 ^{ème} mois	CS 24 ^{ème} mois
BCG		18,0 %	23,5 %
DTPolio	3 doses rappel	97,3 %	92,8 %
Coqueluche	3 doses rappel	97,1 %	92,5 %
Haemophilus Influenzae	3 doses rappel	97,2 %	91,5 %
Hépatite B	3 doses rappel	20,4 %	24,4 %
Pneumocoque	3 doses rappel	42,9 %	59,9 %
ROR	2 doses		29,9 %

Couverture vaccinale ROR à 4 ans (recueil lors des bilans de santé en écoles maternelles 2009 - 2012) = 84,4 %